

L'AMBLYOPIE


MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR

C'EST QUOI ?

L'amblyopie, aussi appelée "**œil paresseux**", est un trouble du développement de la vision qui apparaît chez l'enfant, généralement entre 0 et 6 ans.

Le cerveau reçoit une image de mauvaise qualité d'un œil et finit par l'ignorer. L'œil concerné voit alors de moins en moins bien.

Sans prise en charge, cette baisse de vision peut devenir irréversible.



ET LE STRABISME ?

Le strabisme est le fait que les yeux ne sont pas alignés.

Il peut être un signe d'alerte important : dans de nombreux cas, c'est lui qui permet de détecter une amblyopie.

Sans strabisme visible, l'amblyopie peut passer inaperçue.



VISION NORMALE



STRABISME

DES SIGNES À SURVEILLER

Certains signes doivent vous amener à consulter votre ophtalmologiste.



Il se frotte les yeux



Il présente un strabisme



Il a mal aux yeux ou se plaint de maux de tête



Il cligne, plisse ou ferme souvent un œil, penche sa tête



Il voit mal de loin ou de près, a du mal à évaluer les distances



Il présente un retard ou des difficultés d'apprentissage (lecture, confusion de lettres, fatigue visuelle...)



Il souffre de chalazions à répétition



L'amblyopie peut être **silencieuse** : l'enfant ne se plaint pas car il ne sait pas comment il devrait voir. Pour lui, sa vision est normale.

LE TRAITEMENT

Le traitement de l'amblyopie repose sur 2 actions complémentaires :



Le port de lunettes si besoin



L'occlusion de l'œil dominant (cache) pour faire travailler l'œil "fainéant"



Plus la prise en charge est précoce, plus les chances d'améliorer la vision sont grandes.

QUI CONSULTER ?



Un ophtalmologiste

est le professionnel de référence pour le dépistage et le suivi de l'amblyopie.

À SAVOIR

Le dépistage précoce, **avant 6 ans**, est essentiel pour éviter des conséquences visuelles à long terme.

Observer, repérer, consulter :
votre vigilance peut changer la vision de votre enfant !